

# FLOGIATRIN B12 NF

Piroxicam – Piridoxina - Hidroxocobalamina  
Vía intramuscular – inyectable

Expendio bajo receta

Industria paraguaya

## FÓRMULA

**Flogiatriin B12 NF Inyectable:** Cada frasco ampolla contiene: Piroxicam 20 mg; Excipientes c.s.

Cada ampolla solvente contiene: Piridoxina 250 mg; Hidroxocobalamina 10 mg; Exc c.s.

## INDICACIONES

Patologías neuríticas secundarias a afecciones músculo esqueléticas con intenso componente inflamatorio.

Artritis reumatoide intraarticular extraarticular.

## ACCION TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio no esteroide - Antineurítico

## POSOLOGÍA

Vía intramuscular: 1 frasco ampolla diluido con la ampolla adjunta, una vez al día durante periodos breves.

## INTERACCIONES

Piroxicam: Antiagregantes plaquetarios. Piridoxina (Vitamina B6): La levodopa, la fenitoína y el fenobarbital. Hidroxocobalamina: Neomicina y la colchicina, anticonceptivos orales, anticonvulsionantes.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a sus componentes, embarazo, lactancia, úlcera gastroduodenal activa, tuberculosis. Insuficiencia cardiaca congestiva grave, diabetes. Insuficiencia renal grave.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En pacientes con antecedentes de úlcera péptica, osteoporosis, inestabilidad emocional, tuberculosis o infecciones agudas y en pacientes geriátricos con o sin hipertensión arterial.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

A dosis alta puede producir albuminuria, disfunción hepática y ligera modificación de la fórmula leucocitaria, con leucopenia.

En tratamiento prolongado pueden presentarse molestias gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, rash cutáneo, tinnitus y/o urticaria.

## SOBREDOSIFICACIÓN

Piridoxina: en caso de sobredosificación accidental está indicado un tratamiento sintomático y de mantenimiento de las funciones vitales.

La administración de carbón activado puede disminuir la absorción de piroxicam.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse a Emergencias Médicas (Centro Nacional de Toxicología), Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, Teléfono 220418

## PRESENTACIÓN

Flogiatriin B12 NF Inyectable: 1 frasco ampolla + 1 ampolla solvente 5 mL y 3 frascos ampollas + 3 ampollas solventes 5 mL.

**Producto medicinal - Mantener fuera del alcance de los niños**

**Conservar a temperatura ambiente (entre 15° y 30 ° C)**

**Proteger de la luz**

Elaborado por Laboratorios Lasca de Vicente Scavone & Cia CelSA

Ruta Mcal. Estigarribia Km 9,5. San Lorenzo - Paraguay

D.T.: Nilda Martínez. Química Farmacéutica, Reg Prof N 4692

Para Roemmers S.A.C.I.: Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar

D.T.: Q.F. María R. Irala, Reg Prof N 1406

Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria - M.S.P. y B.S.

Certificado N° 19926-01-EF

